

## UZUPEŁNIA ZDAJĄCY

KOD

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

PESEL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

miejsce  
na naklejkęEGZAMIN MATURALNY Z CHEMII  
POZIOM ROZSZERZONYDATA: **10 czerwca 2019 r.**GODZINA ROZPOCZĘCIA: **9:00**CZAS PRACY: **180 minut**LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: **60**

## Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 24 strony (zadania 1–39). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.
2. Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.
3. W rozwiązaniach zadań rachunkowych przedstaw tok rozumowania prowadzący do ostatecznego wyniku oraz pamiętaj o jednostkach.
4. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.
5. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
7. Możesz korzystać z *Wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki*, linijki oraz kalkulatora prostego.
8. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.
9. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.



MCH-R1\_1P-193

NOWA FORMUŁA



**Zadanie 2. (0–1)**

Ustal i wpisz do tabeli, jaki rodzaj wiązania (kowalencyjne niespolaryzowane, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe) występuje w cząsteczce  $\text{NH}_3$ . Następnie przyporządkuj dwóm związkom:  $\text{LiH}$  i  $\text{PH}_3$ , wartości ich temperatury topnienia:  $692^\circ\text{C}$ ,  $-134^\circ\text{C}$  (pod ciśnieniem 1013 hPa).

Na podstawie: W. Mizerski, *Tablice chemiczne*, Warszawa 2003.


|                                         | LiH    | $\text{NH}_3$ | $\text{PH}_3$                 |
|-----------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------|
| Rodzaj wiązania                         | jonowe |               | kowalencyjne niespolaryzowane |
| Temperatura topnienia, $^\circ\text{C}$ |        | -78           |                               |

**Zadanie 3.**

W czasie pożarów lasów, wyładowań elektrycznych, podczas pracy urządzeń grzewczych lub silników spalinowych możliwa jest reakcja zachodząca między dwoma składnikami powietrza – azotem i tlenem. Te gazy łączą się z wytworzeniem tlenku azotu(II) zgodnie z równaniem:



Powstały bezbarwny i bezwonny tlenek azotu(II) łatwo utlenia się do tlenku azotu(IV)  $\text{NO}_2$ , który jest brunatnym gazem o ostrym zapachu. Tlenek azotu(IV) dimeryzuje z utworzeniem tetratlenku diazotu  $\text{N}_2\text{O}_4$ , który jest gazem bezbarwnym:



Na podstawie: G.W. vanLoon, S.J. Duffy, *Chemia środowiska*, Warszawa 2007, oraz W. Mizerski, *Tablice chemiczne*, Warszawa 1997.

**Zadanie 3.1. (0–1)**

**Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedno właściwe określenie spośród podanych w każdym nawiasie.**

Reakcja syntezy tlenku azotu(II) jest reakcją (endotermiczną / egzotermiczną), o czym świadczy (dodatnia / ujemna) wartość  $\Delta H^\circ$ .

Reakcja dimeryzacji tlenku azotu(IV) ma tym większą wydajność, w im (niższej / wyższej) temperaturze zachodzi. Po ochłodzeniu zabarwienie zawartości zamkniętego naczynia, do którego wprowadzono świeżo otrzymany tlenek azotu(IV)  $\text{NO}_2$ , (nie ulegnie zmianie / stanie się mniej intensywne / stanie się bardziej intensywne).


**Zadanie 3.2. (0–1)**

**Oceń, czy cząsteczka tlenku azotu(IV)  $\text{NO}_2$  jest rodnikiem. Odpowiedź uzasadnij – uwzględnij elektronową strukturę tej cząsteczki.**

.....

.....

### Stężeniowa stała równowagi reakcji



w temperaturze 1000 K jest równa 1.

Na podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, *Tablice chemiczne*, Gdańsk 2001.


W reaktorze o stałej pojemności znajdowało się 6 moli tlenku węgla(II).

**Oblicz, ile moli wody (w postaci pary wodnej) należy wprowadzić do reaktora, aby po ustaleniu się równowagi w temperaturze 1000 K liczba moli wodoru była dwa razy większa od liczby moli tlenku węgla(II).**

Obliczenia:

[illegible]**Zadanie 5. (0–1)**

Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym schematem.




**Napisz numery wszystkich probówek, w których zaszły reakcje chemiczne.**

**Informacja do zadań 6.–8.**

W trzech probówkach I–III znajdują się rozmieszczone w przypadkowej kolejności wodne roztwory trzech soli: azotanu(V) glinu, azotanu(V) potasu i azotanu(V) magnezu. Te roztwory mają taką samą objętość  $V = 5 \text{ cm}^3$  i jednakowe stężenie molowe  $c_m = 0,2 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ . W celu zidentyfikowania zawartości probówek przeprowadzono dwuetapowe doświadczenie.

W etapie pierwszym do probówek dodano wodny roztwór wodorotlenku potasu.



Po dodaniu niewielkiej ilości roztworu wodorotlenku potasu powstały w probówkach I i II białe osady, a w probówce III nie zaobserwowano objawów reakcji.

W etapie drugim doświadczenia do probówek z wytrąconymi osadami dodano kolejne porcje roztworu wodorotlenku potasu. Objawy reakcji zaobserwowano tylko w probówce II.

**Zadanie 6. (0–1)**

**Zidentyfikuj kationy obecne w roztworach 1., 2. i 3. Wpisz ich wzory lub nazwy do tabeli.**

| Roztwór | Wzór lub nazwa kationu |
|---------|------------------------|
| 1.      |                        |
| 2.      |                        |
| 3.      |                        |

**Zadanie 7. (0–1)**

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej podczas pierwszego etapu doświadczenia w probówce I.

.....

**Zadanie 8. (0–1)**

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w probówce II podczas drugiego etapu doświadczenia, jeżeli w tym procesie powstaje anion kompleksowy.


.....

**Informacja do zadań 9.– 10.**

Przygotowano dwa wodne roztwory:

- kwasu siarkowego(VI) o stężeniu  $0,01 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$  (roztwór I)
- wodorotlenku sodu o pH równym 13 (roztwór II) do którego dodano kilka kropli alkoholowego roztworu fenoloftaleiny.

Podczas mieszania roztworów I i II zachodzi reakcja opisana poniższym równaniem:



### Zadanie 9. (0–2)

Do kolby zawierającej 100 cm<sup>3</sup> roztworu I dodawano niewielkimi porcjami roztwór II.

**Oblicz pH roztworu, który powstał po dodaniu 50 cm<sup>3</sup> roztworu II do roztworu I. Przyjmij, że objętość powstałego roztworu jest sumą objętości roztworu I i dodanego roztworu II.**

[illegible]

### Zadanie 10. (0–1)

**Uzupełnij zdanie. Wybierz i zaznacz odpowiedź A. albo B. oraz jej uzasadnienie 1., 2., 3. albo 4.**

Jeżeli do  $100\text{ cm}^3$  roztworu I dodamy  $10\text{ cm}^3$  roztworu II, to otrzymana mieszanina


|           |                                |          |           |                                       |
|-----------|--------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------|
| <b>A.</b> | będzie bezbarwna,              | ponieważ | <b>1.</b> | pH roztworu zmaleje.                  |
|           |                                |          | <b>2.</b> | pH roztworu wzrośnie.                 |
| <b>B.</b> | przyjmie malinowe zabarwienie, |          | <b>3.</b> | odczyn roztworu będzie obojętny.      |
|           |                                |          | <b>4.</b> | odczyn roztworu nadal będzie kwasowy. |

**Informacja do zadań 11.–12.**

W poniższej tabeli podana jest informacja dotycząca barwy wodnych roztworów zawierających wybrane jony.

| Jon              | Barwa roztworu    |
|------------------|-------------------|
| $\text{Ni}^{2+}$ | zielony roztwór   |
| $\text{Cu}^{2+}$ | niebieski roztwór |
| $\text{Ag}^+$    | bezbarwny roztwór |

Płytki wykonane z dwóch metali: miedzi i niklu, zanurzone do roztworów azotanu(V) srebra(I) znajdujących się w dwóch oddzielnych probówkach. Przebieg doświadczenia zilustrowano na poniższym schemacie.



Po pewnym czasie trwania doświadczenia w każdej probówce zaobserwowano zmianę barwy roztworu.

**Zadanie 11. (0–1)**

Uzupełnij poniższą tabelę. Podaj barwę roztworu (lub informację o braku barwy) w probówkach I i II przed zanurzeniem metalowych płytek oraz barwy roztworów po wyjęciu płytek.

| Numer probówki | Barwa roztworu           |                   |
|----------------|--------------------------|-------------------|
|                | przed zanurzeniem płytki | po wyjęciu płytki |
| I              |                          |                   |
| II             |                          |                   |

**Zadanie 12. (0–1)**

Spośród kationów:  $\text{Ag}^+$ ,  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{Ni}^{2+}$ , wybierz i napisz wzór tego kationu, który jest najsilniejszym utleniaczem.

.....



### Zadanie 13.2. (0–1)


Mączka dolomitowa może być stosowana do poprawiania jakości gleby.

**Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedno właściwe określenie spośród podanych w każdym nawiasie.**


Trudno rozpuszczalne w wodzie węglany wapnia i magnezu reagują z obecnymi w glebie jonami ( $\text{H}_3\text{O}^+$  /  $\text{OH}^-$ ), w wyniku czego przekształcają się w rozpuszczalne wodorowęglany. W wyniku tego procesu pH gleby (maleje / wzrasta), dlatego mączka dolomitowa może być stosowana do (alkalizacji / zakwaszania) gleby o zbyt (niskim / wysokim) pH.

### Zadanie 14. (0–2)


Próbkę stałego chlorku sodu o masie 7,5 g poddano działaniu stężonego kwasu siarkowego(VI). Zaszła wówczas reakcja opisana równaniem:



Tę reakcję prowadzono aż do całkowitego zużycia chlorku sodu. Otrzymany w tej reakcji chlorowodór zebrano, rozpuszczono w wodzie i poddano działaniu tlenku manganu(IV), w wyniku czego zaszła reakcja zgodnie z równaniem:



Powstały w tej przemianie chlor wprowadzono do wodnego roztworu jodku potasu i otrzymano 6,35 grama jodu zgodnie z równaniem:



**Oblicz wydajność przemiany II, jeżeli przemiany I i III zaszły z wydajnością równą 100%.**

[illegible]

**Zadanie 15.**

Ołów praktycznie nie rozтворя się w rozcieńczonym kwasie jodowodorowym ani w rozcieńczonym kwasie bromowodorowym. Metal ten rozтворя się natomiast całkowicie w rozcieńczonym kwasie azotowym(V), a także w kwasie octowym. W reakcji ołowiu z rozcieńczonym kwasem azotowym(V) powstają azotan(V) ołowiu(II), tlenek azotu(II) oraz woda. W reakcji tego metalu z kwasem octowym wydziela się wodór i powstaje kompleks ołowiu(II) o wzorze  $[\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_4]^{2-}$ .

Na podstawie: J. Minczewski, Z. Marczenko, *Chemia analityczna. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa*, Warszawa 2001.

**Zadanie 15.1. (0–1)**

Na podstawie informacji wprowadzającej, szeregu elektrochemicznego metali oraz tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków wybierz poprawne wyjaśnienie zachowania ołowiu wobec rozcieńczonego kwasu jodowodorowego i kwasu bromowodorowego. Zaznacz P przy poprawnym wyjaśnieniu.

|    |                                                                                                                                                                                                                          |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. | Ołów praktycznie nie rozтворя się w rozcieńczonym kwasie jodowodorowym ani w rozcieńczonym kwasie bromowodorowym, ponieważ nie wypiera on wodoru z kwasów.                                                               | P |
| 2. | Ołów praktycznie nie rozтворя się w rozcieńczonym kwasie jodowodorowym ani w rozcieńczonym kwasie bromowodorowym, ponieważ w tych roztworach powierzchnia ołowiu pokrywa się pasywną warstwą trudno rozpuszczalnej soli. | P |
| 3. | Ołów praktycznie nie rozтворя się w rozcieńczonym kwasie jodowodorowym ani w rozcieńczonym kwasie bromowodorowym, ponieważ te kwasy są słabe i beztlenowe.                                                               | P |

**Zadanie 15.2. (0–2)**

Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy):

- równanie procesu redukcji zachodzącego podczas reakcji ołowiu z rozcieńczonym kwasem azotowym(V).

.....


- równanie procesu utleniania w reakcji ołowiu z kwasem octowym. Uwzględnij powstawanie jonu kompleksowego tego metalu.

.....



**Informacja do zadań 17.–18.**

Przeprowadzono ciąg przemian opisany poniższym schematem.

**Zadanie 17.1. (0–1)**

Organiczny produkt reakcji 1. ma jeden izomer o takim samym szkieletcie węglowym.

Napisz nazwę systematyczną opisanego izomeru organicznego produktu reakcji 1.

.....

**Zadanie 17.2. (0–2)**

Napisz równanie reakcji prowadzącej do otrzymania związku organicznego oznaczonego na schemacie literą B (reakcji 2. ) oraz równanie reakcji prowadzącej do otrzymania związku organicznego oznaczonego na schemacie literą C (głównego produktu reakcji 3.). Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

Równanie reakcji 2.:

.....

Równanie reakcji 3.:

.....


**Zadanie 18. (0–1)**

Uzupełnij poniższą tabelę. Określ typ (addycja, eliminacja, substytucja) oraz mechanizm (elektrofilowy, nukleofilowy, rodnikowy) reakcji 1. i 3.

|            | Typ | Mechanizm |
|------------|-----|-----------|
| Reakcja 1. |     |           |
| Reakcja 3. |     |           |

**Informacja do zadań 19.–20.**

Atom wodoru w cząsteczce etynu (acetyleny) wykazuje większą kwasowość niż atomy wodoru w grupach alkilowych. Fakt ten potwierdza reakcja acetyleny z aktywnym metalem, która przebiega zgodnie z poniższym równaniem.



Produktami opisanej reakcji są gazowy wodór i acetylenek monosodu.

Podobne właściwości wykazują także inne alkiiny z wiązaniem potrójnym znajdującym się na końcu łańcucha ( $\text{RC}\equiv\text{C}-\text{H}$ ).

Na podstawie: R. Morrison, R. Boyd, *Chemia organiczna*, Warszawa 1985.

**Zadanie 19. (0–1)**

Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) wszystkich alkinów, które zawierają sześć atomów węgla w cząsteczce i nie reagują z sodem.

**Zadanie 20. (0–1)**

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji hydrolizy acetylenku monosodu. Określ, jaką funkcję (kwasu czy zasady) według teorii Brønsteda pełni jon  $\text{HC}\equiv\text{C}^-$ .

Równanie reakcji:

.....

Według teorii Brønsteda jon  $\text{HC}\equiv\text{C}^-$  pełni funkcję .....

**Informacja do zadań 21.–23.**

Do probówek, zawierających przygotowany wcześniej odczynnik, wprowadzono dwa różne związki: do probówki I – propan-2-ol, a do probówki II – propano-1,2-diol. Zawartość każdej probówki wymieszano. Objawy reakcji zaobserwowano tylko w jednej probówce.

**Zadanie 21.1. (0–1)**

Uzupełnij schemat doświadczenia. Wybierz i podkreśl nazwę użytego odczynnika.

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| Schemat doświadczenia                         |  |
| Odczynnik:                                    |  |
| – świeżo wytrącony wodorotlenek miedzi(II)    |  |
| – zakwaszony roztwór manganianu(VII) potasu   |  |
| – woda bromowa z dodatkiem wodorowęglanu sodu |  |

**Zadanie 21.2. (0–1)**

Opisz zmiany możliwe do zaobserwowania po dodaniu propan-2-olu i propano-1,2-diolu do wybranego odczynnika. Uwzględnij wygląd zawartości probówek przed reakcją i po dodaniu badanych związków.

|             | Wygląd zawartości probówki |            |
|-------------|----------------------------|------------|
|             | przed reakcją              | po reakcji |
| Probówka I  |                            |            |
| Probówka II |                            |            |

**Zadanie 22. (0–1)**

Napisz, jaka różnica w budowie cząsteczek badanych alkoholi była przyczyną różnicy w przebiegu doświadczenia. Odnies się do struktury cząsteczek obu związków.

.....

.....

.....

**Zadanie 23. (0–1)**


Uzupełnij zdanie. Wybierz i zaznacz odpowiedź A. albo B. oraz jej uzasadnienie 1. albo 2.

Gdyby zamiast propano-1,2-diolu do probówki II wprowadzono 1,4-dihydroksybenzen, efekt doświadczenia byłby

|    |           |          |    |                                                                |
|----|-----------|----------|----|----------------------------------------------------------------|
| A. | taki sam, | ponieważ | 1. | 1,4-dihydroksybenzen jest fenolem.                             |
| B. | inny,     |          | 2. | w cząsteczce 1,4-dihydroksybenzenu są dwie grupy hydroksylowe. |

**Zadanie 24. (0–2)**

Cykloheksanol reaguje z manganianem(VII) potasu w środowisku kwasowym zgodnie z poniższym schematem.




Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równania reakcji redukcji i utleniania zachodzących w czasie opisanej przemiany. Uwzględnij, że reakcja przebiega w środowisku kwasowym. Dobierz współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

Równanie reakcji redukcji:


.....

Równanie reakcji utleniania:

.....



Ubichinon Q10 (koenzym Q10) jest niezbędnym elementem łańcucha oddechowego. Zapobiega produkcji rodników, oksydacyjnym modyfikacjom białek, lipidów oraz DNA i pełni wiele innych funkcji w organizmie. Poniżej przedstawiono wzór opisujący strukturę cząsteczki ubichinonu Q10.

**Zadanie 25. (0–1)**

Przeprowadzono analizę elementarną pewnej substancji biologicznie czynnej i stwierdzono, że zawiera ona 82,13% masowych węgla i 10,44% masowych wodoru.

**Wykonaj obliczenia i oceń, czy badanym związkiem mógł być ubichinon Q10 o wzorze sumarycznym  $C_{59}H_{90}O_4$ . W obliczeniach przyjmij, że  $M_C = 12,00 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ,  $M_H = 1,00 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ,  $M_O = 16,00 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ .**

[illegible]

Badanym związkiem ..... ubichinon.

**Zadanie 26. (0–1)**

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

|    |                                                                                                                                                          |          |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. | Cząsteczka ubichinonu Q10 o strukturze przedstawionej w informacji zawiera 14 wiązań $\pi$ .                                                             | <b>P</b> | <b>F</b> |
| 2. | Cząsteczka ubichinonu Q10 o strukturze przedstawionej w informacji zawiera pierścień aromatyczny.                                                        | <b>P</b> | <b>F</b> |
| 3. | W łańcuchowym fragmencie cząsteczki ubichinonu Q10 o strukturze przedstawionej w informacji wszystkim atomom węgla można przypisać hybrydyzację $sp^2$ . | <b>P</b> | <b>F</b> |

**Zadanie 27.**

Utlenianie i redukcja zachodzą w organizmie w ciągłym cyklu. Częsteczka ubichinonu przyjmuje dwa elektrony i redukuje się do ubichinolu – związku aromatycznego, który jest pochodną fenolu. Ten proces jest odwracalny, gdyż ubichinol łatwo ulega ponownemu utlenieniu do ubichinonu. Utlenianie ubichinolu zachodzi w środowisku o odczynie obojętnym.

**Zadanie 27.1. (0–1)**


Uzupełnij schemat procesu utleniania ubichinolu do ubichinonu w środowisku obojętnym – wpisz w wykropkowane miejsca wybrane wzory i symbole.



ubichinol + 2 ..... → ubichinon + 2 ..... + 2 .....

**Zadanie 27.2. (0–1)**

Uzupełnij poniższy rysunek, tak aby przedstawiał wzór cząsteczki ubichinolu.

**Zadanie 28. (0–1)**

Poniżej przedstawiono wzory sześciu związków organicznych.


|                                        |                                           |                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| I<br>C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CHO | II<br>C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH    | III<br>C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CH <sub>2</sub> OH |
| IV<br>CH <sub>3</sub> COOH             | V<br>CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> COOH | VI<br>HCOOCH <sub>3</sub>                               |

Uzupełnij poniższe zdania. Wpisz numery, którymi oznaczono wzory odpowiednich związków.

1. Octan fenylu jest produktem reakcji związków oznaczonych numerami ..... i ..... .
2. Izomerami są związki oznaczone numerami ..... i ..... .
3. W wyniku redukcji związku oznaczonego numerem I powstaje związek oznaczony numerem ..... .

**Zadanie 29. (0–1)**

Aldehydy, w których cząsteczkach nie ma atomów wodoru w położeniu  $\alpha$  (atomy wodoru przy atomie węgla związanym z grupą aldehydową), reagują z mocnymi zasadami zgodnie ze schematem:



Podczas tego procesu, zwanego reakcją Cannizzaro, następuje jednoczesne przejście aldehydu w produkty o niższym oraz o wyższym stopniu utlenienia węgla (dysproporcjonowanie lub dysmutacja).

Na podstawie: K.-H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, *Nowoczesne kompendium chemii*, Warszawa 2007.


Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) lub uproszczony aldehydu, z którego w wyniku reakcji Cannizzaro otrzymano benzenokarboksylian sodu (benzoesan sodu) i fenylometanol (alkohol benzyłowy), oraz podaj formalne stopnie utlenienia atomów węgla, które uczestniczą w procesie utleniania i redukcji (przed reakcją i po reakcji).

| Wzór aldehydu |
|---------------|
|               |

| Stopień utlenienia atomu węgla |                    |                       |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| w aldehydzie                   | w benzoesanie sodu | w alkoholu benzyłowym |
|                                |                    |                       |

**Informacja do zadań 30.– 32.**

Poniżej przedstawiono ciąg przemian chemicznych, w których biorą udział związki organiczne umownie oznaczone literami Q, X, Y i Z oraz metanian etylu.

**Zadanie 30. (0–1)**

Zaznacz odpowiedź, w której podano poprawne nazwy związków Q, X, Y i Z.

|    | Q           | X     | Y       | Z              |
|----|-------------|-------|---------|----------------|
| A. | chlorometan | metan | metanal | metanolan sodu |
| B. | chloroetan  | eten  | etanol  | metanian sodu  |
| C. | chlorometan | etan  | etanol  | etanian sodu   |
| D. | chloroetan  | eten  | etanol  | metanolan sodu |

**Zadanie 31. (0–1)**

Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) cząsteczek dwóch związków będących izomerami metanianu etylu oraz podaj nazwy tych związków.

| Wzór I       | Wzór II      |
|--------------|--------------|
| <br><br><br> | <br><br><br> |
| Nazwa        | Nazwa        |
| <br><br><br> | <br><br><br> |

**Zadanie 32. (0–1)**


Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

|    |                                                                                                                        |   |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 1. | Przemiana związku X do związku Y przebiega według mechanizmu rodnikowego.                                              | P | F |
| 2. | Związek Y można otrzymać ze związku Q z pominięciem związku X, jeżeli zastosuje się wodny roztwór wodorotlenku potasu. | P | F |
| 3. | Wszystkie przemiany przedstawione na schemacie to reakcje substytucji.                                                 | P | F |

**Zadanie 33. (0–1)**


Cząsteczki kwasu 2-hydroksybutanowego są chiralne.

Uzupełnij poniższy schemat, tak aby otrzymać wzory enancjomerów kwasu 2-hydroksybutanowego w projekcji Fischera.




**Informacja do zadań 34.– 35.**


Przygotowano cztery wodne roztwory o tym samym stężeniu molowym, z których każdy zawierał inną pochodną węglowodoru. Te związki zostały opisane poniższymi wzorami z uwzględnieniem dominującej formy, w jakiej występują w roztworze.




I



II



III



IV

**Zadanie 34.**

W trzech probówkach A, B i C znajdują się w przypadkowej kolejności wodne roztwory – o równej objętości – trzech różnych pochodnych węglowodorów wybranych spośród związków I–IV. Stwierdzono, że cząsteczki związku, którego roztwór znajduje się w probówce B, są chiralne, a cząsteczki związków, których roztwory znajdują się w probówkach A i C, nie są chiralne.

Każdy roztwór podzielono na dwie próbki o tej samej objętości i przeprowadzono dwa doświadczenia umożliwiające identyfikację badanych substancji.

Doświadczenie pierwsze

W roztworach z probówek A, B i C zanurzono uniwersalny papierek wskaźnikowy. Okazało się, że tylko w roztworach z probówek A i B uniwersalny papierek wskaźnikowy zmienił barwę z żółtej na czerwoną.

Do roztworów (o tej samej objętości) z probówek A, B i C wprowadzano stopniowo roztwór wodorotlenku sodu o stężeniu molowym  $0,1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$  z dodatkiem alkoholowego roztworu fenoloftaleiny. Okazało się, że roztwór w probówce B przereagował całkowicie z dwukrotnie większą objętością roztworu wodorotlenku sodu niż roztwór w probówce A i roztwór w probówce C.

Doświadczenie drugie

Do roztworów (o tej samej objętości) z probówek A, B i C wprowadzono kwas solny z dodatkiem oranżu metylowego. Zmianę barwy z czerwonej na żółtą zaobserwowano tylko po wprowadzeniu kwasu solnego do roztworu z próbki C.

**Zadanie 34.1. (0–1)**

Napisz numery związków, których roztwory znajdowały się w probówkach A, B i C.

|            | Numer związku |
|------------|---------------|
| probówka A |               |
| probówka B |               |
| probówka C |               |

**Zadanie 34.2. (0–2)**

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, jakiej ulega związek znajdujący się w probówce B podczas doświadczenia pierwszego, oraz równanie reakcji, jakiej ulega związek znajdujący się w probówce C podczas doświadczenia drugiego. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych przedstawione w informacji wstępnej.

Probówka B:

.....

Probówka C:

.....

**Zadanie 35. (0–1)**

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

|    |                                                                                                                          |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 1. | W roztworze o $\text{pH} < 5$ związek I występuje głównie w formie kationu.                                              | P | F |
| 2. | Liczba wszystkich możliwych produktów kondensacji jednej cząsteczki związku III i jednej cząsteczki związku IV wynosi 2. | P | F |
| 3. | Związek III to aminokwas białkowy.                                                                                       | P | F |

**Zadanie 36. (0–1)**

Do probówki zawierającej roztwór białka jaja kurzego wprowadzono stężony kwas azotowy(V), a następnie dodano wody destylowanej.

**Sformułuj wnioski wynikające z przeprowadzonego doświadczenia. Wybierz i zaznacz poprawne zakończenie zdania.**

Białko uległo denaturacji, a żółte zabarwienie to rezultat

- A. zniszczenia struktury pierwszorzędowej cząsteczek białka.
- B. zniszczenia elementów struktury trzeciorzędowej cząsteczek białka.
- C. nitrowania pierścieni aromatycznych, obecnych w łańcuchach bocznych reszt aminokwasowych.
- D. utleniania grup aminowych, obecnych w bocznych łańcuchach reszt aminokwasowych.

**Zadanie 37.**

W trzech probówkach (I–III) znajdowały się następujące substancje stałe: fruktoza, sacharoza i skrobia. W celu ich identyfikacji przeprowadzono trzy serie doświadczeń. W pierwszej serii doświadczeń do wszystkich probówek dodano wodę o temperaturze 20 °C i wymieszano zawartość każdego naczynia. W dwóch probówkach zaobserwowano rozpuszczenie substancji stałych i powstanie roztworów, natomiast w probówce III powstała zawiesina. W drugiej serii doświadczeń do probówek I i II dodano zalkalizowany świeżo strącony wodorotlenek miedzi(II) i wymieszano ich zawartość. W obu probówkach powstały roztwory o szafirowym zabarwieniu. W trzeciej serii doświadczeń, po ogrzaniu szafirowych roztworów otrzymanych w serii drugiej, tylko w probówce I pojawił się ceglasty osad.

**Zadanie 37.1. (0–1)**

**Napisz nazwy związków, które zidentyfikowano podczas przeprowadzonych trzech serii doświadczeń.**

Probówka I: .....

Probówka II: .....

Probówka III: .....

**Zadanie 37.2. (0–1)**

**Napisz, jaki element budowy cząsteczek związków znajdujących się w probówkach I i II zdecydował o powstaniu szafirowego zabarwienia roztworów w drugiej serii doświadczeń.**

.....  
.....  
.....

**Zadanie 37.3. (0–1)**

**Wyjaśnij, dlaczego w trzeciej serii doświadczeń ceglasty osad nie powstał w wyniku ogrzania roztworu znajdującego się w probówce II.**

.....  
.....  
.....

**Zadanie 38. (0–2)**

Poniżej przedstawiono wzory sumaryczne cukrów i ich pochodnych.


| I              | II             | III                  | IV             |
|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| $C_5H_{10}O_5$ | $C_6H_{12}O_6$ | $C_{12}H_{22}O_{11}$ | $C_6H_{12}O_7$ |

Uzupełnij poniższe zdania. Wpisz numery, którymi oznaczono wzory odpowiednich związków.


- W wyniku reakcji związku ..... z amoniakalnym roztworem zawierającym jony srebra powstają aniony związku ..... . Wodorotlenek miedzi(II) utworzy roztwór o szafirowym zabarwieniu po dodaniu do związków .....
- Cukrami prostymi są związki ..... . Wiązanie *O*-glikozydowe występuje w cząsteczce związku .....

**Zadanie 39. (0–1)**

Przygotowano wodny roztwór sacharozy, który zakwaszono kwasem siarkowym(VI) i przeprowadzono reakcję hydrolizy sacharozy w temperaturze 298 K. Ta reakcja przebiega zgodnie ze schematem:



W czasie doświadczenia mierzono stężenie sacharozy w mieszaninie reakcyjnej i wyniki tych pomiarów przedstawiono na poniższym wykresie.



Na podstawie: W. Mizerski, *Tablice chemiczne*, Warszawa 1997.

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

|    |                                                                                                                                                                  |   |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 1. | Szybkość hydrolizy sacharozy była największa w momencie rozpoczęcia reakcji.                                                                                     | P | F |
| 2. | W momencie, w którym stężenie sacharozy wyniosło $0,15 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ , stężenie glukozy było równe $0,75 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ . | P | F |
| 3. | W opisanej reakcji hydrolizy kwas siarkowy(VI) pełni funkcję katalizatora.                                                                                       | P | F |

## **BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)**